



## حقيقت پانه

### د روږدي خطر زياتوالی

هغه لويان چې په 15 يا 16 کلنۍ کې يې څښل پيل کړي (يا دمخه) پنځه ځله د هغو کسانو په پرتله چې څښل يې په ۲۱ کلنۍ کې پيل کړي د الکول اعتياد احتمال يې ډير دی.

### د زده کړو پرېښودو کچې لوړوالی

د عالي ليسې هغه زده کونکي چې الکول کاروي پنځه چنده ډير احتمال لري چې ښوونځي پرېږدي او يا دا باور پيدا کړي چې ښه نتايج ارزښت نلري.

### د نورو مخدره موادو د استعمال کچه زياتوالی

په مکرر ډول شراب څښونکي (نږدې 1 ميليون د عالي ليسې زده کونکي په ټول هيواد کې) درې چنده ډير احتمال لري چې په خطرناک چلند کې ښکيل شي، په شمول د نورو مخدره توکو کارول لکه چرس او کوکايين.

### خطرناک ترينه مخدره مواد = الکول

الکول ده هر بل مخدره مواد نه په ډيره کچه ده ۲۱ کلونه نه کوچيني ځوانان وژني.

### شخصي زخم او جرم

په ۲۰۰۹ کال کې، تقريباً ۱۸۴۴ جرمي واقعي او، ۹۴۹،۴۰۰ غير وژونکي جرمونه لکه غلا او بريد ترسره شوي، تر دې څنگه ۱،۸۱۱،۳۰۰ ملکيت باندې حمله، په شمول دغلا، تيختنونه، دموتږ غلا دقانوني سن نه کوچني ځوانان ترسره کړي

### په هر سيستم اغيزه کوي

الکول نه هضم کيږي. دا په مستقيم ډول د وينې جريان کې جذب کيږي او د بدن په هر سيستم اغيزه کوي.

### د موټر چلولو پر مهال نبايد الکول استفاده شي

که ستاسو بدن کې ۰،۰۰۵ BAC په کچه څښاک موجود وي، چې په بشپړ ډول سرک کې قانوني دی، ستاسې د موټر د ويجاړولو امکانات ۱۰۰ سلنه ډير دي تر هغه چا چې څښاک يې نه وي کړی. په ۰،۰۸ کې ستاسې د حادثه چانس درې چنده کيږي

### ډير څښاک

په کور کې ځوانانو ته د څښاک اجازې ورکولو سره يې استعمال زياتيږي. هغه کسان چې د ۲۱ کالو څخه کم عمر لري ۹۰ فيصد حالاتو کې ډير څښاک کوونکي دي. ډير څښاک کوونکي په ډير لنډ وخت کې ډير الکول کاروي (8 BAC over).



THE DEFINITION OF BINGE DRINKING:



قانون مه ماتوئ

د ځنباک قانوني عمر 21 کاله او يا تر هغې لور دی. کوچنيانو ته د ځنباک برابرول حتی د سرپرست لخوا غیر قانوني دي. حتی که ځنبل يې په کور کې يا د سرپرست په شتون کې وشي.

دماغ تر ۲۵ کلنۍ پورې وده کوي

ځکه چې د لسو نه تر نولس کلنۍ پورې دماغ د پراختيا په يوه مهم پړاو کې دی، الکول د ځوان دماغ په اړه ځانگړې اغيزه لري. دا اغيزې عبارت دي له: روږديتوب، ژور ځپکان، اضطراب، د IQ کمښت او د زده کړې کمزوریدل، حافظه، او د نورو خطرونو په چلند کې لوی پېښې (ډوبیدل، د خونديتوب پرته جنسي فعاليت، او نور).

د "نه" ويل تاسو نورمال کوي


په 2016 کې، د مخدره توکو کارولو او روغتيا په اړه ملي سروې راپور ورکړی چې د 12 څخه تر 20 کلونو پورې 19% ځوانان الکول څښي او 12% په تېرو 30 ورځو کې د ډير ځنباک راپور ورکړی.

الکول نه مخلوطیږي

د هر ډول مخدره توکو سره په گډه د الکول کارول د دې مخدره توکو سره پېښ شوي منفي اړخيزې اغيزې ډيروې. دا کولی شي وړاندیز شوي درمل (د بېلگې په توگه رواني درمل) غیر اغيزمن کړي.

د ناراستۍ سره مبارزه


دوه لومړني دليلونه چې ځوانان د الکول کارولو راپور ورکوي ناراستۍ او سمدستي رضایت دی. ځوانانو ته د "هو" د ويلو لپاره يو څه چمتو کول د مخنيوي ترټولو مؤثره وسيله ده.



دا د مور او پلار لپاره گرانه ده چې د 12 کلن ماشوم تصور وکړي چې د مخدره توکو څخه کار اخلي. دا ممکن دقیقاً د دې دليل وي چې ډيری والدین د خپلو ماشومانو سره د موادو کارولو په اړه خبرې کولو ته انتظار باسي، ډيری وختونه تر هغه چې ډير ناوخته وي. دا مهمه ده چې ستاسو د ماشوم سره د مخدره توکو او الکول په اړه ډيری خلاصې خبرې اترې ولرئ - مخکې له دې چې دوی په ښوونځي کې تجربه يا ستونزې سره مخ شي.


د الکولو نږدې 68% مړينې د ترافيکي تلفاتو له وجې نه، بلکې د نورو پېښو له امله دي لکه د الکول مسموميت، سقوط او ځان وژنه. سربېره پردې، هغه تنکي ځوانان چې د کم عمره ځنباک او مخدره توکو په کارولو بوخت دي د نورو خطرونو لکه د جنسي تېري او د تاوتریخوالي عملونو لپاره لوړ خطر لري.

د ماشوم پلار او مور ده هغه په ژوند کې ډير تاثیر لري، او هغوي تصميم نیسي چې آیا د دوی ماشوم به الکول څښي يا نه



Source: The Century Council (10-18 year olds); GfK Roper Youth Report (13-17 year olds in 2012; 8-17 in 2003)  
\*In GfK Roper Report the respondents could only select one response for this question.  
\*\* Media was not a response category in 2003

دقانونی سن نه کوچنی ځوانان وقات امار



Estimates come from FBI, CDC and NHTSA data. Data is for deaths involving 15 to 20 year-old underage drinkers. Details at madd.org.